

Inhaalvaccinatiewijzer

Kind en Gezin voorziet inhaalvaccinaties voor:

- Kinderen onder de 3 jaar
- Niet-schoolgaande kinderen van 3 jaar en ouder
- Schoolgaande kinderen tot 5 jaar in specifieke situaties zoals vluchtelingen en asielzoekers in overleg met het CLB als Kind en Gezin de vaccinatie sneller kan aanbieden

Algemene regels

De CB-arts stelt het (inhaal) vaccinatieschema op met advies van de adviserend arts indien nodig.

Er is een document met vaccinatiegegevens:

- Een **onderbroken** schema moet **niet herbegonnen** worden
- **Beoordeel** de dosissen op **geldige minimumleeftijd en interval** volgens [richtlijnen HGR](#).
- **Vul verder aan** volgens het Vlaams vaccinatieschema

Bijzondere situatie hexavalent vaccin: Bij een kind van 11/12 maanden waarbij het eerste hexalent vaccin pas gegeven werd vanaf 2 maanden, met een interval van minstens 8 weken met de tweede dosis, dan volstaat nog **1 dosis (boosterdosis) hexavalent vaccin** met een interval van minstens 6 maanden na de tweede dosis.

Voorbeeld: een 2-4-11/12; 3-5-11/12 of 4-6-11/12 schema is **ook geldig** als het reeds **afgerond is** of als de **derde dosis** (boosterdosis) **6 maanden na de tweede dosis** gegeven wordt.

Een booster Hexyon is geldig **vanaf 50 weken** (-5 d) . Dit is gelijk aan 11 maand en 10 dagen . Bij een booster voor 11 maand en 10 dagen kan een inhaalvaccin overwogen worden maar andere inhaalvaccins (MBR) blijven belangrijker.

Er is geen document met vaccinatiegegevens = beschouw het kind als **niet gevaccineerd**:

- kind jonger dan 5 maanden: start het **basisschema** op
- kind van 5 maanden en ouder: start het **inhaalschema** (volgens [richtlijnen HGR](#)). De volgende pagina's geven de inhaalschema's weer volgens de HGR en per instapleeftijd.

Bij een niet of onvolledig gevaccineerd kind vanaf 12 maanden geef steeds **voorrang** aan MBR (**MMRvaxPro®**) en het hexavalent vaccin (**Hexyon®**).




Instapleeftijd: 5 maanden tot en met 9 maanden

(zonder enig schriftelijk bewijs van vaccinatie)

- Hexyon®: 3 dosissen in plaats van 4
- Prevenar 13®: 3 dosissen
- MMRvaxPro®: 1 dosis
- Nimenrix®: 1 dosis

Deze vaccins mogen simultaan of met gelijk welk interval gegeven worden met ander(e) vaccin(s)

Wettelijk zijn drie dosissen Imovax Polio nodig (2 plus 1 schema) een **interval van 8 WEKEN** tussen de eerste en tweede dosis en een herhalingsdosis vanaf 12 maanden en minstens 6 maanden na de tweede dosis.




Instapleeftijd: 10 maanden tot en met 11 maanden

(zonder enig schriftelijk bewijs van vaccinatie)

- Hexyon®: 3 dosissen in plaats van 4
- Prevenar 13®: 2 dosissen in plaats van 3
- MMRvaxPro®: 1 dosis
- Nimenrix®: 1 dosis

Deze vaccins mogen simultaan of met gelijk welk interval gegeven worden met ander(e) vaccin(s)

Wettelijk zijn drie dosissen Imovax Polio nodig (2 plus 1 schema) een **interval van 8 WEKEN** tussen de eerste en tweede dosis en een herhalingsdosis vanaf 12 maanden en minstens 6 maanden na de tweede dosis.



Instapleeftijd: 12 maanden tot en met 23 maanden

(zonder enig schriftelijk bewijs van vaccinatie)

- Hexyon®: 3 dosissen in plaats van 4
- Prevenar 13®: 1 dosis vanaf 12 maand
- MMRvaxPro®: 1 dosis
- Nimenrix®: 1 dosis

Deze vaccins mogen simultaan of met gelijk welk interval gegeven worden met ander(e) vaccin(s)

Wettelijk zijn drie dosissen Imovax Polio nodig (2 plus 1 schema) een interval van 8 WEKEN tussen de eerste en tweede dosis en een herhalingsdosis vanaf 12 maanden en minstens 6 maanden na de tweede dosis.

Hexyon® dosis 1

8 weken

Hexyon® dosis 2

6 maand

Hexyon® dosis 3

MMRvaxPro®
Prevenar 13®
Nimenrix®



Instapleeftijd: 24 maanden tot en met 4 jaar

(zonder enig schriftelijk bewijs van vaccinatie)

- Hexyon®: 3 dosissen in plaats van 4
- Prevenar 13®: geen dosis vanaf 2 jaar
- MMRvaxPro®: 1 dosis
- Nimenrix®: 1 dosis

Deze vaccins mogen simultaan of met gelijk welk interval gegeven worden met ander(e) vaccin(s)

Wettelijk zijn drie dosissen Imovax Polio nodig (2 plus 1 schema) een interval van 8 WEKEN tussen de eerste en tweede dosis en een herhalingsdosis 6 maanden na de tweede dosis.



MMRvaxPro®
Nimenrix®



Instapleeftijd: 5 jaar tot en met 12 jaar


(zonder enig schriftelijk bewijs van vaccinatie)

- Hexyon®: 3 dosissen in plaats van 4
- Prevenar 13®: geen dosis vanaf 2 jaar
- MMRvaxPro®: 1 dosis (indien het kind ouder is dan 10 jaar 2 dosissen)
- Nimenrix®: 1 dosis

Deze vaccins mogen simultaan of met gelijk welk interval gegeven worden met ander(e) vaccin(s)

Wettelijk zijn drie dosissen Imovax Polio nodig (2 plus 1 schema) een interval van 8 WEKEN tussen de eerste en tweede dosis en een herhalingsdosis 6 maanden na de tweede dosis.

Zie ook de info van de Centra voor Leerlingbegeleiding:
[Inhaalschema's voor kinderen en jongeren | VWVJ](#)



Voorbeelden

Niet gevaccineerd kind vanaf 12 maanden:

Optie 1

- MMRvaxPro®, Hexyon® dosis 1 en zo snel mogelijk Prevenar 13®
(waarbij geen interval nodig is met MMRvaxPro® en Hexyon® dosis 1)
- Hexyon® dosis 2 met 8 weken interval na Hexyon® dosis 1
- Hexyon® dosis 3 met 6 maanden interval na Hexyon® dosis 2
- Nimenrix® zo snel mogelijk vanaf 15 maanden

Optie 2

- MMRvaxPro®, Hexyon® dosis 1 en Prevenar 13® tegelijkertijd op verschillende prikplaatsen als haalbaar (3 prikken)
- Hexyon® dosis 2 met 8 weken interval na Hexyon® dosis 1
- Hexyon® dosis 3 met 6 maanden interval na Hexyon® dosis 2
- Nimenrix® zo snel mogelijk vanaf 15 maanden

Niet gevaccineerd kind vanaf 24 maanden:

Optie 1

- MMRvaxPro®, Hexyon® dosis 1 en zo snel mogelijk Nimenrix®
(geen interval nodig met de MMRvaxPro® en Hexyon® dosis 1)
- Hexyon® dosis 2 met 8 weken interval na Hexyon® dosis 1
- Hexyon® dosis 3 met 6 maanden interval na Hexyon® dosis 2

Optie 2

- MMRvaxPro®, Hexyon® dosis 1 en Nimenrix® tegelijkertijd op verschillende prikplaatsen als haalbaar (3 prikken)
- Hexyon® dosis 2 met 8 weken interval na Hexyon® dosis 1
- Hexyon® dosis 3 met 6 maanden interval na Hexyon® dosis 2